

Bulletin élaboré sur la base des observations réalisées dans le cadre du réseau Limousin, par la FREDON, les Chambres d'Agriculture et NATEA Agriculture.

Bulletin disponible sur <http://www.limousin.synagri.com/>,  
sur <http://draaf.limousin.agriculture.gouv.fr/> et sur <http://www.fredon-limousin.fr/>

Abonnement gratuit sur simple demande à [accueil@limousin.chambagri.fr](mailto:accueil@limousin.chambagri.fr)



## COLZA



### Stades phénologiques et observations du réseau

Toutes les parcelles observées, le colza va du stade 2 feuilles (B2) au stade 6 feuilles (B6) :

- 45 % au stade 2 à 3 feuilles (B2 B3)
- 18 % au stade 4 feuilles (B4)
- 37 % au stade 5 à 6 feuilles (B5 B6)

	Semis	Stade	Limaces (pièges)	Baris (cuvette)	Charançon bourgeon terminal (cuvette)	Tenthredines (cuvette)	Altises piégées (cuvette)*	F Fréquence (% plantes touchées) I Intensité (% surfaces feuilles touchées)		
								Dégâts deTenthredine	Dégâts limaces	Morsures altises
87 - Rancon	24/08/2014	6 feuilles			1		3	50% F / 5% I		
87 - Nexon	28/08/2014	5 feuilles					5G		20% F / 5% I	30%
87 - Breuilaufa	01/09/2014	5 feuilles					3G	13% F / 10% I		
87 - Peyrilhac	03/09/2014	4 feuilles	Cuvette renversée						5% I	10%
87 - Feytiat	05/09/2014	3 feuilles					2G			5%
87 - St-Hilaire-Bonneval	09/09/2014	2 feuilles								
87 - Le Palais-sur-Vienne	09/09/2014	2 feuilles	Cuvette renversée							
23 - Genouilhac	01/09/2014	4 feuilles		3			23G	10% F / 2% I		40%
23 - Viersat	01/09/2014	2 feuilles					21G	40% F		76%
23 - Bourganeuf	03/09/2014	5 feuilles					46G			
23 - St-Sulpice-Le-Guérétois	01/09/2014	3 feuilles		7			1G	50% F / 40% I		5%

\* G = grosse altise ; P = petite altise

#### Directeur de publication :

Monsieur Jean-Philippe VIOLLET  
Président Chambre Régionale d'Agriculture du Limousin  
Boulevard des Arcades  
87 060 LIMOGES CEDEX  
05 55 10 37 90  
[accueil@limousin.chambagri.fr](mailto:accueil@limousin.chambagri.fr)

#### Référents filières et rédacteurs du bulletin :

Céréales à paille  
Philippe PENICHOU  
FREDON Limousin

05 55 04 64 53  
[ppenicou@fredon-limousin.fr](mailto:ppenicou@fredon-limousin.fr)

Colza - Maïs

Valérie LACORRE  
Chambre Départementale d'Agriculture Haute-Vienne

05 87 50 40 00  
[valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr](mailto:valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr)



## Petites et grosses altises

### Éléments de biologies :

**Petite altise** : Petit coléoptère noir ou bicolore (noir, avec une bande longitudinale jaune sur chaque élytre). Adulte 2 à 2.5 mm.

**Grosse altise** : Gros coléoptère au corps noir et brillant avec reflets bleus métalliques sur le dos. Extrémités des pattes, des antennes et de la tête roux doré. Adulte 3 à 5 mm.



Source : P. Penichou, FREDON

Rappel des dégâts : Morsures sur cotylédons et jeunes feuilles, entraînant une réduction de la surface foliaire.

Observations du réseau : Des altises ont été piégées dans toutes les parcelles observées, excepté à Saint-Hilaire Bonneval (87).

Des morsures sont observées sur des pieds dans les parcelles de Nexon, Peyrilhac, Feytiat (87), Genouilhac, Viersat et Saint-Sulpice Le Guereois (23). De 5 à 76% des plantes sont touchées.

Période de risque : De la levée à « 3 feuilles ».

Seuil de nuisibilité : Lorsque 8 pieds sur 10 présentent des morsures, ou lorsque ¼ de la surface végétative des pieds est attaquée.

**Evaluation du risque - altises** : Risque moyen, 55% des parcelles observées ont dépassé le stade de sensibilité.

---

## Limaces

Observations du réseau : Il a été noté des dégâts de limaces sur les parcelles de Peyrilhac, Nexon (87), Genouilhac, Viersat et Saint-Sulpice Le Guereois (23).

Période de risque : De la levée (particulièrement sensible au ravageur) jusqu'au stade 3 feuilles.

**Evaluation du risque - limaces** : Restez vigilant sur les parcelles n'ayant pas dépassé le stade 3 feuilles.

## Recenser les facteurs favorables aux limaces sur la parcelle à l'aide de la grille de risque ACTA :

### **1 - Culture en place**

- Blé ou orge ou prairie : 1 pt
- Colza : 6 pts
- Tournesol : 4 pts
- Maïs ou pois : 2 pts
- Betterave ou pomme de terre : 6 pts



### **2 - Historique limace de l'année dernière**

- Beaucoup de limaces : 4 pts
- Quelques limaces : 2 pts
- Pas de limaces : 0 pt



### **3 - Sol**

- Argileux : 5 pts
- Limono-argileux : 4 pts
- Argilo-calcaire : 4 pts
- Limoneux : 2 pts
- Sablo-limoneux : 1 pt
- Sableux : 0 pt



### **4 - Précédent**

- Colza : 6 pts
- Céréales d'hiver : 4 pts
- Cultures de printemps : 1 pt
- Pluriannuelles (prairies...) : 5 pts



### **5 - Interculture**

- Déchaumage après récolte + labour : 0 pt
- Labour sans déchaumage après récolte : 2pts
- Déchaumage après récolte : 1 pt
- Déchaumage mais pas après récolte : 2 pts



### **6 - Végétation durant l'interculture**

- Très développée : 4 pts
- Peu développée : 2 pts
- Rare : 1 pt



### **7 - Préparation lit de semences**

- Grossière : 4pts
- Intermédiaire : 2pts
- Fine : 0 pt



### **8 - Date de semis**

- Semis précoce : 1 pt
- Semis normal : 2 pts
- Semis tardif : 4 pts

**= Niveau de risque**

**0**

**FAIBLE**

**18**

**MOYEN**

**23**

**FORT**

**+28**

## Charançon du bourgeon terminal

Observations du réseau : 1 charançon a été piégé sur la parcelle de Rancon (87).

Période de risque : De la levée au stade rosette.

Seuil de nuisibilité : Il n'y a pas pour le charançon du bourgeon terminal de seuil de risque. Etant donné la nuisibilité potentielle de cet insecte, il est considéré que sa seule présence sur les parcelles, repérée dans les cuvettes, est un risque. Les petits colzas sont beaucoup plus sensibles. Les femelles sont rarement aptes à pondre dès leur arrivée sur les parcelles. On considère que le risque est plus important 8 à 10 jours après les premières captures.

**Evaluation du risque – charançon du bourgeon terminal** : La période de risque étant actuellement en cours, surveillez vos parcelles.

## Tenthrede de la rave

Observations du réseau : Dégâts sur la parcelle de Rancon et Breuilaufa (87).

Période de Risque : de la levée jusqu'à 6 feuilles.

Seuil de nuisibilité : présence de larves sur plantes avec le 1/4 de la surface foliaire détruite.



Source : P. Penichou, FREDON

**Evaluation du risque – Tenthrede de la rave** : Restez vigilant.

## A RETENIR

### COLZA

**Altises** : Risque moyen, 55 % des parcelles observées ont dépassé le stade de sensibilité.

**Limaces** : Restez vigilant sur les parcelles n'ayant pas dépassé le stade 3 feuilles.

**Charançon du bourgeon terminal** : la période de risque étant actuellement en cours, surveillez vos parcelles.

**Tenthrede de la rave** : restez vigilant.

## PROCHAIN BULLETIN MARDI 7 OCTOBRE

*N.B. : Ce Bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture du Limousin dégage toute responsabilité quant aux décisions prises pour la protection des cultures. La protection des cultures se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques.*

*Action pilotée par le Ministère de l'Agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto*

